



DAGER OG UKER	VEGETATIV FASE				GENERATIV FASE						
	ROTDAN- NELSE	I	II		I			II	III	IV	
	D1-5	D6-25	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
LYSTIMER	18	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Doseringer i ml per 10 l											
CANNA HYDRO VEGA A (MY)	24 - 31	28 - 35	28 - 35	28 - 35							
CANNA HYDRO VEGA B (MY)	24 - 31	28 - 35	28 - 35	28 - 35							
CANNA HYDRO FLORES A (MY)					28 - 35	28 - 35	28 - 35	28 - 35	24 - 32	21 - 28	
CANNA HYDRO FLORES B (MY)					28 - 35	28 - 35	28 - 35	28 - 35	24 - 32	21 - 28	
CANNA RHIZOTONIC	40	20	20	20	5	5	5	5	5		
CANNAZYM		25	25	25	25	25	25	25	25	25 - 50 *	25 - 50
CANNABOOST			20 **	20	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40
CANNA PK 13/14								15			
CANNA CALMAG AGENT***	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4	0 - 4
CANNA FLUSH									40		40
mS/cm											
EC-VANN***	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
EC-ERNÆRING	1,4 - 1,8	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	2,0 - 2,5	1,4 - 1,8	1,2 - 1,6	
EC TOTALT	1,6 - 2,0	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	2,2 - 2,7	1,6 - 2,0	1,4 - 1,8	0,2

Denne dyrkningsplanen er beregnet på planter som utvikler blomster eller frukt, med utgangspunkt i en uke gamle stiklinger eller frøplanter. Varigheten av hver fase kan variere avhengig av arten.

- * Dobbel CANNAZYM-dosering til 50 ml/10 l, hvis substratet gjenbrukes.
- ** Øk CANNABOOST til maksimalt 40 ml/10 l gjennom blomstringen for ekstra styrke.
- *** CANNA CALMAG AGENT-doseringen avhenger av EC-vannet, som ideelt sett bør være 0,2-0,4 mS/cm. Hvis startvannet har en EC på 0,0, kan Calmag tilsettes i maksimal dosering for å oppnå en EC på 0,4 mS/cm. Hvis startvannet allerede er høyere enn 0,0, bør en lavere dose Calmag brukes. Dette eksemplet forutsetter en EC-verdi på vannet som er (justert med Calmag til) 0,2 mS/cm.

For en lengre vekstfase, gjenta de anbefalte dosene fra vegetativ fase I (D6-D25). For en lengre blomstringsfase, gjenta de anbefalte dosene fra generativ fase I (W3-W5). Tilsett CANNA PK 13/14 i perioden 3-4 uker før høsting. Az ajánlott pH-érték 5,2 és 6,2 között van

